ialuset® PLUS

cicatrisant à l'acide hyaluronique
+ sulfadiazine argentique

Crème et compresse

Qu'est-ce que ialuset® PLUS ?

Le produit **ialuset® PLUS** est un pansement sous forme de crème ou compresse imprégnée, associant de l'acide hyaluronique et de la sulfadiazine argentique.

L'acide hyaluronique intervient à toutes les étapes de la cicatrisation, de la phase vasculaire inflammatoire en passant par le bourgeonnement, puis la réépithélialisation [1].

La sulfadiazine argentique est un dérivé sulfamide qui possède un effet antibactérien à large spectre. L'action combinée des ions argent, bactéricides, et de la molécule de sulfadiazine, bactériostatique, va empêcher la croissance d'un large éventail de bactéries essentiellement sur les bactéries Gram -.

Dans quels cas utiliser ialuset® PLUS ?

ialuset® PLUS est indiqué dans la cicatrisation des plaies infectées et des brûlures, des affections dermatologiques primitivement bactériennes ou susceptibles de se surinfecter.

L'évolution de la plaie reste à l'appréciation du médecin.

Présentation de ialuset® PLUS

ialuset® PLUS est un dispositif médical de classe III, remboursé (LPPR), délivré avec ou sans prescription médicale, qui se présente soit sous la forme de crème (tube de 100 g), soit sous la forme de compresse imprégnée stérile (boîte de 10 ; taille de 10 x 10 cm). La prise en charge est assurée pour le traitement des brûlures du second degré superficiel et du second degré profond. Marquage CE 0344.

Fabricant: **Laboratoires Genevrier**

IALUSET® PLUS CRÈME

Tube 100 g

Code ACL : **3401079348692**
Code LPPR : **136.6921**

IALUSET® PLUS COMPRESSE STÉRILE

Taille 10 x 10 cm

Boîte de 10 compresses

Code ACL : **3401079348753**
Code LPPR : **139.7790**

Veuillez vous reporter à la notice du produit pour obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des indications, contre-indications, avertissements, précautions et des informations indispensables au bon usage.

ialuset® PLUS
cicatrisant à l'acide hyaluronique
+ sulfadiazine argentique

Composition de ialuset® PLUS

ialuset® PLUS crème

Acide hyaluronique (sel sodique) 0.2% ; sulfadiazine argentique 1%. Autres composants: decylester d'acide oléïque, alcool cétéarylique et sodiumlauryl sulfate et sodium cétéaryl sulfate, macrogol, sorbitol, glycérol, eau.

ialuset® PLUS compresse stérile

Compresse stérile imprégnée de crème d'acide hyaluronique (sel sodique) 0.05%, de sulfadiazine argentique 1%. Autres composants : macrogol, glycérol, eau.

Mode d'emploi de ialuset® PLUS

Nettoyer la plaie selon les méthodes de désinfection habituelles et **rincer** au sérum physiologique

Appliquer sur la plaie la crème en couche épaisse de 2-3 mm ou la compresse

Recouvrir d'un pansement secondaire adapté



Renouveler. Tout en maintenant la peau alentour, soulever délicatement le pansement. En cas de légère adhésion du pansement avec la plaie, mouiller abondamment avec du sérum physiologique

Précautions d'utilisation de ialuset® PLUS

- **Respecter les méthodes de nettoyage et de désinfection des brûlures et des plaies, ainsi que de leurs pourtours.**
- **Éviter d'exposer les parties du corps traitées par ialuset® PLUS à une lumière vive (risque de photosensibilisation).**
- **Chez les sujets souffrant d'une insuffisance rénale ou hépatique, éviter l'application de la crème sur les plaies ouvertes.**
- **Compresse stérile à usage unique : ne pas utiliser si l'emballage unitaire est endommagé. Ne pas réutiliser pour éviter tout risque de contamination.**
- **Crème : bien refermer le tube après chaque utilisation. Ne pas appliquer l'embout du tube directement sur la plaie.**
- **À conserver à une température inférieure à 30 C et à l'abri de la lumière.**
- **Ne pas dépasser la date d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.**

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Contre-indications de ialuset® PLUS

- **Sensibilisation connue aux sulfamides, générale ou locale (eczéma de contact).**
- **Allergies à l'un des constituants.**

1. Chen WY, Abatangelo G. Functions of hyaluronan in wound repair. Wound Repair Regen. 1999;7(2):79-89.

Laboratoires Genevrier
L'EXIGENCE DE VOTRE SANTÉ

Septembre 2016